

Sinta[®] Vit ADEC

Ergänzungsfuttermittel flüssig für Pferde, Rinder, Schweine, Schafe, Ziegen, Fohlen, Kälber, Ferkel, Schaf-/Ziegenlämmer und Geflügel.

Mikroemulsion 1 ml enthält:

50.000 IE Vitamin A, 200 IE Vitamin D₃, 50 mg Vitamin E, 50 mg Vitamin C

Auch zum Einmischen in Glycerin bestens geeignet!

Ernährungsphysiologische Bedeutung:

Mit der Steigerung der Leistung der Nutztiere ergeben sich nicht nur an die Energie- und Eiweißversorgung, sondern auch an die Vitaminzufuhr höhere Anforderungen, insbesondere in der Periode des raschen Körperwachstums, während der Trächtigkeit und Laktation sowie beim Geflügel während der Legeperiode. Dabei nehmen die drei fettlöslichen Vitamine A, D₃ und E sowie der in diesem Spezialprodukt enthaltene Anteil an Vitamin C hinsichtlich der Vitaminversorgung eine besondere Stellung ein.

Unterversorgungen mit einem oder mehreren dieser Vitalstoffe können Störungen

- des Immunsystems mit erhöhter Anfälligkeit gegenüber Infektionskrankheiten, insbesondere bei Jungtieren,
- des Stoffwechsels mit Entwicklungs- und Wachstumsstörungen, insbesondere während der Rekonvaleszenz,
- der Reproduktionsleistung, wie Fertilität, Spermaqualität und Deckbereitschaft zur Folge haben.

Die in Form einer Mikroemulsion vorliegende Formulierung weist gegenüber herkömmlichen Zubereitungsformen, gemessen an deren biologischer Verfügbarkeit, erhebliche Vorteile auf.

Fütterungshinweis:

Direkt, mit Futter bzw. Tränke; zum Ausgleich ernährungsbedingter Unterversorgungen, insbesondere - vor, während oder nach besonderen Bedarfsphasen.

Dosierungsempfehlung:

Als Orientierung - unter Berücksichtigung der für die enthaltenen Zusatzstoffe zulässigen Tagesdosis/kg der Gesamtfutterration zu verstehen.

Rinder/Pferde	2 ml/50 kg LM (max. 20 ml)	
Fohlen/Kälber:	2 ml/50 kg LM (max. 10 ml)	
Schweine:	2 ml/50 kg LM (max. 6 ml)	
Schafe, Ziegen:	3 - 4 ml/Tier	
Ferkel:	1 - 3 ml/Tier	
Schaf- und Ziegenlämmer:	3 ml/Tier	
10 Truthühner:	5 ml	} auf die tägliche Wasserration verteilt
100 Legehühner:	15 - 20 ml	
100 Küken:	10 ml	
Tauben:	0,5 ml/Liter Wasser	

Insbesondere empfiehlt es sich:

- **Stuten und Kühen** 15 ml vor der Besamung sowie täglich während der 5 darauffolgenden Tage
- **Fohlen und Kälbern** unmittelbar nach der Geburt 10 ml
- **Zuchthengsten und -bullen** 10 ml 2 x wöchentlich
- **Mutterschweinen** 6 ml vor der Besamung sowie täglich während der 5 darauffolgenden Tage,
- **Ferkeln und Lämmern** unmittelbar nach der Geburt 1 - 2 ml
- **Zuchtebern** 6 ml 2 x wöchentlich
- **Schafen und Ziegen** 4 ml vor der Besamung sowie täglich während der 5 darauffolgenden Tage
- **Schaf- und Ziegenlämmer** unmittelbar nach der Geburt 3 ml
- **Widdern und Ziegenböcke** 3 ml 2 x wöchentlich

zu verabreichen.

Dosierungshilfe:

1 Teelöffel: ca. 4 ml

1 Esslöffel: ca. 12 ml

Dosierpumpe: 1 Pumpendruck = 1 - 5 ml

Packungsgrößen:

100- und 500-ml-Flasche